



<b>Nom :</b>	Goura couronné
<b>Distribution :</b>	G. c. minor sur les îles occidentales de Papouasie et à Céram (introduit ?) ; G. c. cristata au nord-ouest de la Nouvelle-Guinée
<b>Description :</b>	66-75 cm
<b>Poids :</b>	1,8-2,4 kg
<b>Présentation :</b>	plumage gris bleu ; crête de plumes lâches compressée latéralement ; haut des ailes rouge sombre ; taches blanches sur les ailes ; trait noir du bec jusqu' autour des yeux ; iris et pattes rouges : mélanisme connu ; G. c. minor est de taille plu
<b>Alimentation :</b>	baies, fruits tombés, larves et insectes trouvés au sol en petits groupes de 2 à 10 oiseaux
<b>Reproduction :</b>	gros nid de brindilles jusqu'à 10 m du sol ; 1 gros œuf blanc incubé 1 mois ; envol après un autre mois mais le jeune couche dans le nid chaque soir pendant 40 jours encore et est nourri par le père pendant 2 mois ; maturité sexuelle dès 15 mois.
<b>Migration :</b>	sédentaire
<b>Statut de conservation :</b>	vulnérable à cause de la chasse pour ses plumes et sa viande, l'exploitation forestière ; espèce normalement protégée

### LE SAVIEZ VOUS ?

A l'instar des pigeons frugivores le jeune goura quitte son nid avant la fin de sa croissance mais dès son plus jeune âge il ressemble à la copie miniature de ses parents