



<b>Nom :</b>	Spatule rose
<b>Distribution :</b>	du sud-est des Etats-Unis au centre-est de l'Amérique du Sud
<b>Description :</b>	68-86 cm
<b>Poids :</b>	1400 g environ
<b>Présentation :</b>	bec en spatule ; ailes, abdomen, queue et pattes rosés ; peau faciale orangée en période de reproduction
<b>Alimentation :</b>	petits poissons et crustacés (crevettes) ; insectes aquatiques ; quelques fibres et racines végétales ; se nourrit seule ou en groupes, avançant dans l'eau à lentes enjambées, tout en agitant de gauche à droite son bec
<b>Reproduction :</b>	à la fin de la saison des pluies, en colonies, souvent avec d'autres ciconiiformes et cormorans ; plate-forme de brindilles mêlées d'herbe ; 2-3 œufs ; 22 jours d'incubation ; poussins à duvet blanc et court ; envol vers 6 semaines ; maturité sexuelle à 3 ans minimum
<b>Migration :</b>	sédentaire mais population du nord partiellement migratrices
<b>Statut de conservation :</b>	non menacée mais souvent localisée ; certaines populations en déclin à cause de l'altération des zones de reproduction et de nourrissage, de la chasse et de la pollution

### LE SAVIEZ VOUS ?

#### Histoire américaine mouvementée

Aux Etats-Unis, la spatule rose était commune le long de la « Gulf coast » au début du XIX<sup>ème</sup> siècle : elle fut presque entièrement exterminée dans les années 30 à cause de la récolte de ses belles plumes ; elle fut ensuite protégée vers 1940, ce qui permit l'augmentation de ses effectifs (1000 couples en Floride et 2500 au Texas dans les années 70) ; hélas, ses populations déclinent à nouveau à cause des campagnes de contrôle des moustiques et l'altération croissante des zones de reproduction et de nourrissage.